



MILTINA AR

Alimento dietético destinado para usos médicos especiales para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante en casos de **reflujo gastroesofágico comprobado**.

65Kcal/100ml



C.N. 185537. 4

- ✓ **Semillas de algarrobo**, espesante natural que no afecta a la digestión y tiene un efecto instantáneo anti-reflujo. No se altera con las enzimas de la saliva y al contrario que el almidón, llega intacto al estómago. Facilita el tránsito y el vaciamiento gástrico, permitiendo una mejor digestibilidad.
- ✓ No contiene **hidrolización parcial**.
- ✓ Excelente disolución a bajas temperaturas.
- ✓ Relación caseína/proteínas séricas: 44/56

Miltina AR es una fórmula para lactantes desde el primer día de vida o como suplemento lácteo de una dieta diversa a partir del 6º mes.

CANTIDAD NETA:

400 g e

INGREDIENTES:

Leche descremada, suero de leche en polvo desmineralizado, aceites vegetales, maltodextrina, lactosa, goma de harina de semilla de algarrobo, carbonato de calcio, emulgente: lecitina de soja, citrato de potasio, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, clorato de potasio, clorato de sodio, vitamina C, L-tirosina, citrato de sodio, carbonato de magnesio, taurina, L-fenilalanina, lactato ferroso, L-triptófano, niacina, óxido de zinc, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina A, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, vitamina B6, vitamina B1, sulfato cúprico, vitamina B2, iodato de potasio, ácido fólico, vitamina K1, molibdato de sodio, biotina, vitamina D3, seleniato de sodio, vitamina B12.



COMPOSICIÓN:

Información Nutricional	Unidad	Por 100g de polvo	Por 100ml preparado al 13,2%
Energía	KJ	2048	270
	Kcal	489	65
Grasas de las cuales	g	23,7	3,1
saturadas	g	8,7	1,01
Monoinsaturadas	g	10,1	1,3
Polisaturadas	g	4,9	0,6
Ácido linoleico	mg	4307	569
Ácido α -linolénico	mg	612	81
Hidratos de Carbono	g	56,9	7,5
de los cuales Azúcares	g	41,2	5,4
Lactosa	g	39,6	5,2
Glucosa	g	0,2	<0,1
Maltosa	g	1,4	0,2
Dextrinas	g	15,7	2,1
Proteínas	g	10,3	1,4
Sal	g	0,43	0,06
Minerales			
Sodio	mg	170	22
Potasio	mg	505	67
Calcio	mg	450	59
Magnesio	mg	44	5,8
Fósforo	mg	250	33
Cloro	mg	320	42
Calcio: Fósforo	mg	1,8	1,8
Elementos Traza			
Hierro	mg	4,7	0,6
Zinc	mg	4,8	0,6
Cobre	μ g	265	35
Yodo	μ g	64	8,4
Cromo	μ g	14	1,8
Flúor	μ g	39	5,1
Manganeso	μ g	215	28
Molibdeno	μ g	32	4,2
Selenio	μ g	9,8	1,3
Vitaminas			
Vitamina A	μ g	485	64
Vitamina D	μ g	8,2	1,1
Tiamina (Vitamina B1)	μ g	480	63
Riboflavina (Vitamina B2)	μ g	825	109
Niacina	μ g	4910	648
Ácido Pantoténico	μ g	2850	376
Vitamina B6	μ g	455	64
Biotina	μ g	17	2,2
Ácido Fólico	μ g	66	8,7



Vitamina B6	µg	480	63
Vitamina B12	µg	1,34	0,18
Vitamina C	mg	70	9,2
Vitamina K	µg	45	5,9
Vitamina E	mg	6,0	0,79
Colina	mg	94	12
Taurina	mg	39	5,1
Inositol	mg	35	4,6
Osmolaridad	mosmol/l		237
Disolución Carga renal	mosmol/l		93

Los valores nutricionales están sujetos a variaciones normales que ocurren al utilizar productos naturales

DOSIFICACIÓN:

Cada bebé es único. Las cantidades indicadas en el envase son aproximadas y pueden variar según cada bebé. Miltina AR es espesado naturalmente por la adición de semillas de algarrobo. Para su utilización, recomendamos colocar en el biberón una tetina de evoca ancha para permitir el correcto flujo del alimento.

Cantidad recomendada: por favor, utiliza la cuchara de medida incluida (4,4g).

PREPARACIÓN:

Edad	Agua (ml)	Cucharadas rasas	Producto listo para el consumo (ml)	Biberones / día
1 semana		Conforme prescripción médica		
2-8 semanas	90	3	100	7-8
3 meses	120	4	150	6-7
4 meses	150	5	170	5-6
+ 4 meses	180	6	200	4-5

AVISO IMPORTANTE:

- La leche materna es el mejor alimento para el bebé. Por favor consulta con tu profesional sanitario antes de utilizar Miltina AR.
- Para la salud dental del bebé, no permitir que utilice el biberón como un chupete o succione continuamente el mismo. Como ocurre con la leche materna, la leche de fórmula tiene hidratos de carbono (lactosa) que pueden provocar caries en los dientes.
- La toma de biberón no ha de durar más tiempo que la toma del pecho.
- La alimentación exclusivamente láctea no es suficiente después del 6º mes de vida.
- Este producto ha de ser utilizado bajo supervisión médica.
- No utilizar por vía parenteral.
- Contraindicado en lactantes con alergia/intolerancia a la proteína de la leche de la vaca.



- No utilizar en caso de galactosemia, intolerancia a la lactosa, déficit de galactosidasa e intolerancia a maltosa.
- Asegurarse de seguir las instrucciones correctamente en la preparación del biberón. Una incorrecta preparación y/o almacenamiento del biberón durante un periodo de tiempo mayor al recomendado puede ocasionar el crecimiento de gérmenes no deseados y un daño en la salud del bebé. Preparar el biberón justo en el momento de alimentar al bebé. No reutilizar el contenido sobrante. Lavar los biberones y tetinas a conciencia. No calentar la fórmula en el microondas (riesgo de quemaduras). Cerrar bien la lata después de su apertura.
- Conservar el producto en un lugar fresco y seco y consumir en 3 semanas tras su apertura.